



Acétazolamide

Date de création
27 Février 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'ACETAZOLAMIDE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un diurétique indiqué dans le traitement des glaucomes, des oedèmes ou de l'épilepsie.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'ACETAZOLAMIDE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

En raison du risque important de malformations, ce médicament ne doit jamais être utilisé pendant la grossesse. Les jeunes filles en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement par acétazolamide.

Si votre fille découvre qu'elle est enceinte et qu'elle est traitée par l'acétazolamide, vous devez prendre contact avec son médecin afin qu'il mette en place un suivi spécifique de sa grossesse et de son bébé (échographie, surveillance du volume du liquide amniotique, surveillance la croissance fœtale, bilan électrolytique chez le nouveau-né...)

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance hépatique, rénale ou surrénale sévère, en cas d'antécédent de colique néphrétique ainsi qu'en cas d'intolérance connue aux médicaments appartenant à la famille des sulfamides (certains antibiotiques et certains antidiabétiques).

La fonction rénale devra être surveillée chez les enfants souffrant d'insuffisance rénale chronique.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin de votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Néant.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ACETAZOLAMIDE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ACETAZOLAMIDE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : fourmillements des extrémités disparaissant après quelques jours, augmentation du volume des urines, fatigue, réaction allergique, diminution du taux de potassium dans le sang, augmentation de la glycémie, calcul rénal, myopie transitoire, troubles digestifs.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ACETAZOLAMIDE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois