



Amiloride

Date de création
16 Avril 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'AMILORIDE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans :

- Le traitement de l'hypertension artérielle,
- Le traitement des œdèmes,
- Le traitement du syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L'AMILORIDE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale et d'excès de potassium dans le sang.

Il peut être responsable d'une augmentation de la kaliémie (taux du potassium dans le sang). Des analyses sanguines régulières peuvent être demandées par votre médecin.

Ce médicament ne doit donc pas être associé aux diurétiques élevant le taux de potassium dans le sang ou aux médicaments qui contiennent du potassium.

Ce médicament augmente le volume des urines, surtout en début de traitement. Évitez que votre enfant le prenne le soir.

L'amiloride, comme tous les diurétiques, expose au risque de déshydratation. Veillez à ce que votre enfant boive suffisamment.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin de votre enfant.

2.2 Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être associé avec le lithium, la ciclosporine ou le tacrolimus ainsi qu'avec les antihypertenseurs appartenant à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et de l'angiotensine II (sauf en cas d'hypokaliémie).

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'AMILORIDE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, yaourt ou compote.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'AMILORIDE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : troubles digestifs, sécheresse de la bouche et sensation de soif, vertiges, fatigue, crampes, éruption cutanée, excès de potassium dans le sang.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'AMILORIDE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois