



Aténolol

Date de création
16 Avril 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

2. QU'EST-CE QUE L'ATENOLOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

2.1 Indications thérapeutiques

Ce médicament est un bêtabloquant indiqué dans :

- Le traitement de l'hypertension artérielle,
- Le traitement de certains troubles du rythme cardiaque.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre médecin.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L'ATENOLOL ?

3.1 Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas :

- D'asthme et de broncho-pneumopathie chronique obstructive dans leurs formes sévères,
- D'insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- De choc cardiogénique,
- De blocs auriculo-ventriculaires,
- De rythme cardiaque lent (< 45-50 battements par minute),
- De phénomène de Raynaud et de troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères,
- De phéochromocytome non traité,
- D'hypotension,
- D'antécédent de réaction anaphylactique.

Attention si votre enfant est diabétique car les bêtabloquants peuvent masquer certains symptômes de l'hypoglycémie (palpitations et accélération du cœur).

En cas d'intervention chirurgicale, prévenez l'anesthésiste de la prise de ce médicament.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre médecin.

1.1 Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être associé avec d'autres médicaments pour le cœur (diltiazem, vérapamil).

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ATENOLOL ?

3.1 Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote et de yaourt.

3.2 Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

4.1 Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ATENOLOL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : douleur d'estomac, nausées, vomissements, fatigue en début de traitement, sensation de mains et de pieds froids, troubles de l'érection, ralentissement important du cœur.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ATENOLOL ?

5.1 Conditions de conservation

Conserver à température ambiante

5.2 Péréemption

3 mois