



Carvédilol

Date de création  
3 Aout 2017

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE LE CARVEDILOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique compensée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LE CARVEDILOL ?

### Contre-indications et précautions d'emploi

La posologie doit être adaptée à chaque patient.

Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale particulière, à l'administration de la première dose. L'augmentation des doses, jusqu'à détermination de la dose efficace (définie comme étant la dose maximale tolérée) se fera sous surveillance médicale.

Le pouls, la pression artérielle couchée et debout et l'électrocardiogramme doivent être surveillés à l'instauration du traitement et de manière régulière tout au long du traitement.

Cette période d'adaptation posologique progressive dure au moins 6 semaines.

Ce médicament ne doit jamais être prescrit en cas :

- D'hypersensibilité au carvedilol ou à l'un des constituants de ce médicament
- D'insuffisance cardiaque sévère décompensée, avec signes de surcharge hydrique (œdèmes, ascite, râles pulmonaires de stase),
- De dysfonctionnement hépatique,
- De ralentissement du cœur important,
- D'hypotension artérielle,
- D'asthme sévère ou d'encombrement des bronches ou des poumons,
- D'antécédents de réaction allergique grave
- De troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament est contre-indiqué en association à la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin), ainsi qu'avec certains antiarythmiques (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

## 3. COMMENT UTILISER LE CARVEDILOL ?

### Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LE CARVEDILOL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : Infections, modification de la numération formule sanguine, dépression, étourdissements, céphalées, prise de poids, hypercholestérolémie, hyperglycémie, hypoglycémie, sécheresse oculaire, insuffisance cardiaque, ralentissement du cœur, œdème, hypotension orthostatique, perturbations de la circulation périphérique, asthme, nausée, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, fatigue

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER LE CARVEDILOL ?

### 5.1 Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

### 5.2 Péréemption

3 mois