

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LA CIMETIDINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

1.1 Indications thérapeutiques

La cimétidine est un anti-ulcéreux appartenant à la classe des antihistaminiques de type H2. Elle est indiquée dans le traitement des inflammations de l'œsophage dues aux remontées acides de l'estomac vers l'œsophage et le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Elle peut être utilisée dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA CIMETIDINE ?

2.1 Contre-indications et précautions d'emploi

La disparition des douleurs ne signifie pas que l'ulcère est cicatrisé. Veillez à ce que votre enfant respecte la durée du traitement.

La cimétidine peut provoquer une confusion des idées ou un ralentissement du rythme cardiaque, nécessitant parfois l'arrêt du traitement.

La cimétidine est à utiliser avec précaution si votre enfant souffre d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

2.2 Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec un médicament contenant du carvédilol.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LA CIMETIDINE ?

3.1 Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

3.2 Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

4.1 Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA CIMETIDINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : diarrhée, douleurs musculaires, maux de tête, étourdissements, confusion des idées, éruptions cutanées, états fébriles, gonflement des seins, ralentissement du rythme cardiaque, anomalies de la numération formule sanguine, augmentation de certaines valeurs biologiques (transaminases, créatinine).

La plupart de ces effets sont réversibles à l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LA CIMETIDINE ?

5.1 Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

5.2 Péremption

3 mois