



Disulone

Date de création  
2 Septembre 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE QUE *LE DISULONE* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antibiotique indiqué dans :

- Le traitement de la lèpre en association avec d'autres thérapeutiques,
- La prévention de la toxoplasmose,
- La prévention de la pneumocystose à *Pneumocystis carinii*.

Il peut être indiqué dans d'autres pathologies, parlez-en au médecin qui suit votre enfant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER *LE DISULONE* ?

### Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas :

- D'anémie,
- De méthémoglobinémie,
- D'insuffisance hépatique ou rénale,
- De déficit en G6PD.

Ce médicament peut être responsable d'une anémie ou d'une diminution des globules rouges et blancs ou des plaquettes dans le sang. Une surveillance médicale régulière est nécessaire pendant le traitement : analyses de sang chaque semaine pendant le premier mois, chaque mois pendant les 5 mois suivants puis tous les 3 mois, dosage de la méthémoglobine une fois par semaine, examen neurologique et cutané.

Signalez rapidement au médecin qui suit votre enfant l'apparition d'une éruption cutanée, avec ou sans fièvre. Il peut s'agir d'une réaction allergique potentiellement grave.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Sans objet.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

## 3. COMMENT UTILISER *LE DISULONE* ?

### Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yahourt.

### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. La disulone peut être prise indifféremment pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE DISULONE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : anémie hémolytique, méthémoglobinémie, allergie, démangeaisons, urticaire, photosensibilité, maux de tête, irritabilité, insomnie, diarrhée, selles noires, nausées, vomissements.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER *LE DISULONE* ?

### Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

### Péremption

3 mois