

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LA FLECAINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un anti-arythmique. Il est indiqué dans le traitement de certains troubles du rythme cardiaque tels que les tachycardies supraventriculaires ou les arythmies.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au votre médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA FLECAINE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- D'hypersensibilité à la flécaïnide,
- D'insuffisance cardiaque,
- De trouble de la conduction cardiaque à l'ECG,
- D'état de choc,
- De syndrome de Brugada (maladie héréditaire du cœur responsable de troubles du rythme cardiaque).

Le traitement impose une surveillance médicale et électrocardiographique (ECG) régulière.

En cas d'apparition d'un essoufflement inhabituel, d'une toux, isolée ou associée à une altération de l'état général, d'une fatigue ou d'une fièvre, prolongées ou inexplicables, prévenez votre médecin traitant de votre enfant.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée avec les antiarythmiques donnant des torsades de pointe, en association avec les bêtabloquants utilisés dans les troubles du rythme cardiaque (carvédilol, bisoprolol, métoprolol) et déconseillée avec les anti-arythmiques de même classe I (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, mexilétine, lidocaïne, propafénone, cibenzoline).

Les produits laitiers (lait, les préparations pour nourrissons et peut-être les yaourts) peuvent réduire l'absorption du flécaïnide chez les enfants et les nourrissons. On évitera par conséquent l'administration dans du lait ou un yaourt.

Dans tous les cas, si vous prenez ou avez pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LA FLECAINE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau ou à l'alimentation.

On évitera l'administration dans du lait ou un yaourt (cf. Interactions).

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA FLECAINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : vertiges, tremblements, troubles de la vision, fatigue, maux de tête, nausées, troubles digestifs, aggravation d'une insuffisance cardiaque préexistante.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LA FLECAINE ?

Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois