



Nadolol

Date de création
24 Juillet 2017

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LE NADOLOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un bêta-bloquant indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans le traitement de certains troubles du rythme.

Il peut être indiqué dans d'autres pathologies, parlez-en à votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE NADOLOL ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :

- D'asthme,
- De bronchite chronique,
- D'insuffisance cardiaque non contrôlée,
- De choc cardiogénique,
- De bloc auriculoventriculaire,
- De maladie du sinus,
- De bradycardie,
- De troubles artériels périphériques,
- D'hypotension,
- De phéochromocytome non traité,
- D'antécédent de choc anaphylactique,
- D'hypersensibilité au nadolol.

Le traitement ne doit pas être interrompu brutalement.

Les signes annonciateurs d'une hypoglycémie peuvent être masqués, en particulier tachycardie, palpitations et sueurs. L'utilisation du nadolol se fera avec prudence chez le sujet diabétique.

Les bêta-bloquants sont susceptibles de masquer les signes cardiovasculaires d'une thyrotoxicose.

3. COMMENT UTILISER LE NADOLOL ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à votre prescription médicale.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LE NADOLOL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : fatigue, refroidissement des extrémités, bradycardie (ralentissement du cœur), troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements), bronchospasme, bloc auriculoventriculaire, hypoglycémie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE NADOLOL ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante

Péremption

3 mois