

	Oxitriptan	Date de création 10 Aout 2017
		Version 1
		Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'OXITRIPTAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement du syndrome des myoclonies post anoxiques de Lance et Adams.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'OXITRIPTAN ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Avant de débuter le traitement il est nécessaire de s'assurer de l'absence d'affections rénale, cardiaque ou de tumeur cancéreuse de l'intestin grêle.

Lors de l'arrêt brutal du traitement, un syndrome de sevrage peut être observé avec tremblements, coryza, confusion et chez les patients prédisposés, un état de mal épileptique.

Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et un bronchospasme.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec les IMAO non sélectifs (traitement antidépresseur). Il entraîne un risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique (diarrhée, tachycardie, sueur, confusion voire coma).

Il est impératif de respecter un délai de deux semaines entre l'arrêt de l'IMAO et le début du traitement, et d'au moins une semaine entre l'arrêt du traitement et le début de l'IMAO.

Si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'OXITRIPTAN ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'OXITRIPTAN est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, agitation, irritabilité, euphorie, somnolence, maux de tête, urticaire, œdème, tremblements.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'OXITRIPTAN ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois