



Pravastatine

Date de création
10 Décembre 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LA PRAVASTATINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Indications thérapeutiques

La pravastatine est indiquée chez les enfants de 8 à 18 ans dans le traitement des hypercholestérolémies familiales hétérozygotes.

Elle peut être utilisée dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA PRAVASTATINE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas:

- D'hypersensibilité à la pravastatine,
- D'affection hépatique évolutive,
- D'élévation prolongée et inexplicquée des taux de transaminases sériques supérieure à 3 fois la limite supérieure de la normale.

La pravastatine doit être administrée aux jeunes filles en âge de procréer uniquement si les patientes ainsi que leurs parents ont été informées du risque potentiel et sous couvert d'une contraception efficace.

Si une grossesse est découverte au cours du traitement par la pravastatine, ce dernier doit être interrompu en raison du risque potentiel pour le fœtus.

Chez les enfants avant la puberté, le bénéfice/risque du traitement devra être soigneusement évalué par les médecins avant initiation du traitement.

De manière plus générale, avant 8 ans, l'utilisation de la pravastatine est fortement déconseillée en raison du risque trop important de perturbation du développement sexuel.

Ce médicament peut être toxique pour le foie et les muscles. Signalez à votre médecin toute fatigue, perte d'appétit, douleur ou faiblesse musculaire.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

La pravastatine est contre-indiquée en association avec la Fucidine® (antibiotique) sous forme de comprimés et en solution buvable : augmentation du risque de toxicité musculaire.

Si un traitement par Fucidine® est nécessaire, le traitement par pravastatine devra être suspendu. La pravastatine pourra être réintroduite 7 jours après la dernière dose de Fucidine®.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LA PRAVASTATINE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA PRAVASTATINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : douleurs musculaires (crampes), douleurs articulaires, étourdissements, maux de tête, troubles du sommeil, troubles de la vision, troubles digestifs, élévation de la glycémie (taux de sucre dans le sang), élévation des enzymes hépatiques, atteinte pulmonaire (essoufflement, toux persistante, fatigue inexplicquée).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LA PRAVASTATINE ?

Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois